USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

FistulaCare

EngenderHealth for a better life

ASSISTANCE SOCIO-PSYCHOLOGIQUE EN SANTÉ DE LA REPRODUCTION AXÉE SUR LA CLIENTE À LA SUITE D'UNE RÉPARATION CHIRURGICALE DE LA FISTULE

La femme et/ou le couple souhaite-t-il concevoir à nouveau ?

Non

Explorez les intentions du couple d'espacer ou de limiter les naissances et personnalisez l'assistance socio-psychologique en conséquence.

Évaluez le risque d'infections sexuellement transmissibles (IST) ou de VIH ; orientez la patiente vers des services de conseil et de dépistage volontaire (CDV) du VIH si elle est à risque ou incertaine quant à de futures grossesses.

Indiquez quelles méthodes de PF protègent contre les IST/le VIH, notamment la double protection.

Fournissez une méthode avec une notice d'utilisation ; offrez des préservatifs à utiliser dans le cadre de la double méthode.

Rappelez à la femme et/ou au couple de prévoir une naissance à l'hôpital par césarienne pour éviter une autre fistule au cas où la femme serait à nouveau enceinte à l'avenir.

Oui

La femme et/ou le couple accepte-t-il de retarder toute grossesse pendant une période d'au moins 9 à 12 mois après la réparation chirurgicale

Non

Parlez des avantages de différer une autre grossesse pendant la période recommandée afin que la patiente puisse bénéficier d'une guérison complète et mieux se préparer à la grossesse.

OU

Si la femme et/ou le couple se présente aux séances d'assistance socio-psychologique après la fin de la période recommandée :

- Évaluez le risque de transmission d'IST/VIH de la mère à l'enfant ; conseillez le CDV, s'il y a lieu.
- Voyez si la femme et/ou le couple s'intéresse à utiliser la méthode des jours fixes (MJF) ; si c'est le cas, fournissez-lui un Collier du cycle et une notice d'utilisation.
- Encouragez la femme à s'inscrire tôt aux soins prénatals
  - Recommandez d'autres services, si nécessaire.

Oui

Félicitez la femme et/ou le couple pour sa décision de retarder toute future grossesse pendant la période recommandée afin que la patiente puisse guérir complètement, s'inscrire tôt aux services de soins prénatals, prévoir une césarienne et planifier la naissance, notamment en ce qui concerne l'argent nécessaire et le transport à l'hôpital, avant que l'accouchement ne commence.

Évaluez les connaissances/l'expérience de la cliente en matière de méthodes de planification familiale (PF)

Présentez les méthodes de PF disponibles à la cliente (certains couples souhaiteront peut-être un retard plus long de grossesse, auquel cas des méthodes à longue durée d'action pourraient s'avérer appropriées)

Parlez de la double protection et de l'importance d'empêcher une infection/réinfection IST/VIH transmise de la mère à l'enfant (PTME). Discutez des options en matière de double protection :

- Utilisation correcte de préservatifs lors de chaque acte sexuel.
- Utilisation simultanée de deux méthodes (préservatifs plus une autre méthode de PF), ce qui s'appelle la double méthode.
- Vérifier que les membres du couple ne souffrent pas d'IST ou de VIH et qu'ils restent monogames et en relation fermée.
- N'avoir que des pratiques sexuelles sans risque, éviter le contact génital avec du sperme et des sécrétions vaginales.
- Abstention : retarder ou éviter toute activité sexuelle.

Étudiez l'admissibilité médicale de la patiente pour sa ou ses méthode(s) préférée(s) de PF.

Aidez la cliente à prendre librement une décision éclairée concernant son choix de PF.

Expliquez complètement comment utiliser la méthode choisie,

Insistez sur l'importance de la double protection, ou double méthode.

Fournissez la méthode choisie.

Parlez de l'utilisation et de la disponibilité de la contraception d'urgence.

Offrez une visite de suivi ou une orientation si une méthode n'est pas disponible dans votre site.

Orientez la cliente vers d'autres services, selon les besoins.

CONSIGNEZ toutes vos constatations, les conseils donnés, les méthodes fournies, tout autre traitement dispensé, les orientations vers d'autres services et la date de la prochaine visite prévue, si cela est approprié.